

褥瘡発生リスクアセスメントシート

月 ID

氏名

「K式スケール（金沢大学式褥瘡発生予測スケール）」に一部加筆・修正し使用

前段階要因 [YES 1点]

日中（促さなければ）臥床・自力歩行不可

自力体位変換不可	骨突出あり	栄養状態が悪い	皮膚統合性のリスク
☐ 自分で体位変換できない ☐ 体位変換の意思を伝えられなし ☐ 苦痛症状（ ）により体動制限がある	☐ 仙骨部体圧 40mmHg以上 ・上記が測定できない場合は ☐ 骨突出 （仙骨・尾骨・坐骨結節 大転子・腸骨稜） ☐ 円背・上下肢の拘縮	☐ Alb3.0g/dl未満 ☐ TP6.0g/dl未満 ・上記が測定できない場合は ☐ 浮腫 ☐ 貧血（Hb11.0g/dl以下） ☐ 必要カロリーを摂取していない	☐ 浮腫 ☐ 乾燥 ☐ ひ薄した皮膚 ☐ 肥厚した皮膚 ☐ 循環不良
[]点	[]点	[]点	有 ・ 無

* 当てはまる項目にレ点でチェックする。ただしいくつかチェックしても点数[]=1点、よって総合スコアは最大3点。

前段階スコア

点 + □皮膚

引き金要因 [YES 1点]

	体 圧	湿 潤	ず れ	引き金 スコア	褥瘡
1W ／	体位変換不十分の理由 ☐ 痛み ☐ 呼吸苦 ☐ その他（ ） []点	測定部位（ ） 測定条件（ ） 測定値 mmHg ☐ 尿失禁 ☐ 便失禁 ☐ 発汗 []点	☐ キヤッチアップ30度以上 ☐ 摩擦とずれ []点	点	有・無
2W ／	体位変換不十分の理由 ☐ 痛み ☐ 呼吸苦 ☐ その他（ ） []点	測定部位（ ） 測定条件（ ） 測定値 mmHg ☐ 尿失禁 ☐ 便失禁 ☐ 発汗 []点	☐ キヤッチアップ30度以上 ☐ 摩擦とずれ []点	点	有・無
3W ／	体位変換不十分の理由 ☐ 痛み ☐ 呼吸苦 ☐ その他（ ） []点	測定部位（ ） 測定条件（ ） 測定値 mmHg ☐ 尿失禁 ☐ 便失禁 ☐ 発汗 []点	☐ キヤッチアップ30度以上 ☐ 摩擦とずれ []点	点	有・無
4W ／	体位変換不十分の理由 ☐ 痛み ☐ 呼吸苦 ☐ その他（ ） []点	測定部位（ ） 測定条件（ ） 測定値 mmHg ☐ 尿失禁 ☐ 便失禁 ☐ 発汗 []点	☐ キヤッチアップ30度以上 ☐ 摩擦とずれ []点	点	有・無
5W ／	体位変換不十分の理由 ☐ 痛み ☐ 呼吸苦 ☐ その他（ ） []点	測定部位（ ） 測定条件（ ） 測定値 mmHg ☐ 尿失禁 ☐ 便失禁 ☐ 発汗 []点	☐ キヤッチアップ30度以上 ☐ 摩擦とずれ []点	点	有・無

* 当てはまる項目にレ点でチェックする。ただしいくつかチェックしても点数[]=1点、よって総合スコアは最大3点。

退院時	月 日	有（ステージⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ 部位： ） ・ 無
-----	-----	-------------------------

PEACE HOUSE HOSPICE